

USO AGRÍCOLA

FMC

ACCURATE MAXX

tifensulfurón metil + metsulfurón metil

Herbicida / Gránulos dispersables

Composición Porcentual	% en Peso
Ingrediente Activo:	
tifensulfurón metil: metil 3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)tiofeno-2-carboxilato (Equivalente a 680 g/kg a 20°C).	68.00 %
metsulfurón metil: metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato (Equivalente a 70 g/kg a 20°C).	7.00 %
Ingredientes Inertes:	
Humectantes, dispersante, solvente y carga	<u>25.00</u> %
TOTAL	100.00 %

Registro único:
RSCO-HEDE-0276-0446-034-75

Contenido neto:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote:
Fecha de fabricación: (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.

Titular del registro, importador y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

HECHO EN ALEMANIA / INDIA
ENVASADO EN MÉXICO

PRECAUCIÓN (pantone verde 347 C)

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **ACCURATE MAXX**:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol de mangas largas, guantes impermeables, mascarilla provista de filtro, lentes de seguridad, botas y gorra.
- No coma, beba ni fume durante el manejo del producto, y antes de realizar cualquiera de estas actividades, lávese perfectamente las manos con abundante agua y jabón.
- Después de concluida la jornada laboral, es necesario bañarse y utilizar ropa limpia.
- Lave bien con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volver a usarla.
- El producto sobrante se debe conservar en su envase original, manteniendo este perfectamente cerrado, y en un lugar fresco, seco y ventilado. No reutilice este envase.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - **Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VOMITO.** Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 mL de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg. Una hora después del carbón activado, administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 mL de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
 - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - **Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 - **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.



(pantone verde 347 C)

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

ACCURATE MAXX: está formulado a base de los ingredientes activos tífensulfuron metil y metsulfuron metil que pertenecen a la familia de las Sulfonilureas.

Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto específico, por lo tanto el médico deberá dar un tratamiento sintomático y medidas de soporte. La terapia en los niños deberá ser supervisada por un médico.

Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. Dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: si se ingiere, letargo, confusión, mareos, convulsiones; si se inhala, irritación respiratoria; al contacto con la piel, irritación, comezón, ardor, enrojecimiento, hinchazón o salpullido; al contacto con los ojos, irritación y lagrimeo, dolor y visión borrosa.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **ACCURATE MAXX** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



(pantone verde 347 C)

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ESPECIES DE MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

ACCURATE MAXX es un herbicida sistémico del grupo de las sulfonilureas que se aplica en postemergencia y que controla la maleza en el cultivo que se indica a continuación:

Cultivo	Especies de Maleza	Dosis	Recomendaciones
Trigo (SL)	Chual blanco <i>Chenopodium album</i>	25- 30 g/ha	Realizar una aspersión total al follaje; volumen de aspersión 200 L/ha.
	Chual rojo <i>Chenopodium murale</i>		
	Girasol silvestre <i>Heliantus annuus</i>		
	Mostaza negra <i>Brassica nigra</i>		
	Malva <i>Malva parviflora</i>	30- 35 g/ha	

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.

() Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abrir el sobre con unas tijeras. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua agregar la dosis recomendada. Se recomienda diluir **ACCURATE MAXX** en agua limpia y agregarla al tanque de aplicación. Complete la capacidad del tanque sin dejar de agitar.

Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del follaje. El volumen de agua a utilizar, dependerá de factores como sistema de producción, equipo de aplicación, presión, tipo de boquilla, etapa fenológica del cultivo, entre otros; no obstante, se recomienda utilizar un volumen de agua 200 L/ha para equipos terrestres.

CONTRAINDICACIONES

- No se recomienda la mezcla con graminicidas ya que éstos pierden parcialmente su efecto de control, por lo que, se recomienda separar la aplicación por espacio de 3 a 4 días. Con insecticidas, se recomienda una prueba previa, ya que puede resultar en una clorosis de ligera a fuerte y/o achaparramiento del cultivo.
- No se aplique este producto bajo condiciones de estrés al cultivo (temperaturas cercanas al punto de helada) o bien exceso de humedad o sequía.
- No aplique este producto después del embuche del cultivo.
- No aplique **ACCURATE MAXX** cuando el cultivo haya sido tratado con insecticidas organofosforados sistémicos que se aplican al suelo. Si se aplican insecticidas organofosforados al follaje, éstos deberán aplicarse 7 días antes o 7 días después de la aplicación de **ACCURATE MAXX**.
- No aplique este producto en mezcla con acidificantes.



(pantone verde 347 C)

FITOTOXICIDAD

ACCURATE MAXX no es fitotóxico a las dosis y en el cultivo recomendado, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

ACCURATE MAXX es compatible con insecticidas como Imidacloprid 35 % SC, Gamma Cyalotrina 15 % SC e Imidacloprid 43% + Gamma Cyalotrina 3% ZC que se aplican al follaje. Es compatible con herbicidas tales como la Atrazina 90 % WG registrados para su uso en trigo a excepción de los insecticidas organofosforados. Si se desea hacer alguna mezcla de tanque, deberá hacerse una prueba previa a fin de demostrar eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



(pantone verde 347 C)