

USO AGRÍCOLA
FMC
MYCLOSS
azufre + myclobutanil
Fungicida / Floable

Composición porcentual

Ingrediente Activo:	% en Peso
azufre elemental: azufre elemental (Equivalente a 675 g/L a 20°C)	48.36 %
myclobutanil: alfa-butil- alfa- (4-clorofenil) -1H 1,2,4-triazol 1 propanonitrilo (Equivalente a 28 g/L a 20°C)	2.00 %
Ingredientes inertes: Diluyente, dispersantes, humectantes, surfactante, conservador, vehículo y diluyente	<u>49.64 %</u>
TOTAL:	100.00 %

Registro único:
RSCO- MEZC-1374-301-342-050

CONTENIDO NETO:

Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote:
Fecha de fabricación (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro:
Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.
Planta: Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90434,
Tetla, Tlaxcala. Tel. 01 (241) 418-9300
Oficinas (tels): (33) 3678-2400

Distribuido por:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel. 013330034500.

HECHO EN MÉXICO



PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Perjudicial si se ingiere, inhala ó es absorbido por la piel. Evitar el contacto directo con la piel, ojos y boca y no respirar el rocío de la aplicación.
- Siempre usar equipo protector adecuado, consistente en goggles, guantes de hule resistente a químicos que cubran el antebrazo, sombrero, camisa de manga larga y pantalones largos, cuando mezcle, cargue y aplique este producto.
- La ropa contaminada deberá lavarse por separado en agua caliente antes de volver a usarla.
- Bañarse bien con agua y jabón después de manejar este producto y antes de comer o fumar.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - **Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VÓMITO.** Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 1 vaso de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito. Manténgase al sujeto en reposo y abrigado.
 - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - **Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 - **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dé un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

MYCLOSS pertenece a los siguientes grupos químicos: Azufre y Triazoles (myclobutanil).

Antídoto: Este producto no tiene antídoto por lo tanto proporcione tratamiento sintomático y medidas de soporte.

Síntomas de Intoxicación: las personas expuestas a este producto continuamente o por tiempo prolongado pueden ser afectadas por irritación en los ojos, en la piel, en la nariz, garganta y vías respiratorias presentándose como conjuntivitis o dermatitis.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de **MYCLOSS** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

MYCLOSS es un fungicida curativo y protectante que puede ser usado a partir del momento en el que se detecten las condiciones apropiadas para la aparición de la enfermedad o al observar los primeros síntomas. El uso de **MYCLOSS** permite manejar intervalos más largos entre aplicaciones, por lo que se reduce el número de éstas por temporada. Sus recomendaciones de uso se indican a continuación.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
JITOMATE (1) Chile (1)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	2.0 - 2.5 L/ha	Aplice cuando se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad, o bien, cuando aparezcan los primeros síntomas con una severidad no mayor a un 0.4% del área afectada.
CALABAZA CALABACITA MELON PEPINO SANDIA (1)	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	2.0 - 2.5 L/ha	Aplice cuando se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad, o bien, cuando aparezcan los primeros síntomas con una severidad no mayor a un 0.4% del área afectada.
TOMATE DE CÁSCARA (1)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	2.0 - 2.5 L/ha	Aplice cuando se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad, o bien, cuando aparezcan los primeros síntomas con una severidad no mayor a un 0.4% del área afectada.
VID (14)	Cenicilla <i>Uncinula necator</i>	2.5 - 3.0 L/ha	Realice las aplicaciones de manera preventiva desde las primeras etapas de brotación del cultivo y durante su pleno desarrollo, con un intervalo no mayor de 14 días entre aplicaciones.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 24 horas.

(): Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **MYCLOSS** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada de **MYCLOSS**. Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de

mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogenizar la solución de la mezcla.

El volumen de agua está en función de varios factores, entre los más importantes: la etapa fenológica del cultivo, equipo de aplicación, presión y boquilla a utilizar; por esta razón, se recomienda que siempre calibre su equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen de agua suficiente que le permita cubrir de manera uniforme el follaje del cultivo de acuerdo a su tamaño. Utilizar boquillas para la aplicación de fungicidas que le permitan obtener una densidad mínima de 50 gotas/cm². En equipos montados al tractor, se recomienda que la velocidad de trabajo sea entre 6-8 km/hora. Si el viento aumenta, reduzca la velocidad de trabajo para disminuir la deriva. Para aplicación en banda, utilizar el número de boquillas necesarias para cubrir el follaje del cultivo. La altura óptima de aspersión para las puntas de pulverización de 80° es de 75 cm y 50 cm para las de 110° y el traslape mínimo entre las boquillas debe ser de un 30%. No obstante la altura del aguilón estará en función de la etapa fenológica del cultivo, por lo que se deberán hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las alturas recomendadas por el fabricante.

Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Deposite el envase vacío en un Centro de Acopio Autorizado.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

El personal de aplicación debe estar capacitado y recibir capacitaciones periódicas sobre el manejo y uso correcto de plaguicidas.

CONTRAINDICACIONES

- Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde y no aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h.
- No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30°C.
- No aplicar en presencia de lluvia, o cuando exista posibilidad de la misma.

FITOTOXICIDAD

MYCLOSS no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

MYCLOSS es compatible con los insecticidas y fungicidas comúnmente usados, sin embargo no debe ser mezclado con productos de naturaleza alcalina. Si se desea hacer mezclas, ésta se hará con productos registrados y autorizados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

No realizar más de dos aplicaciones consecutivas de **MYCLOSS**, ni más de 4 por ciclo de cultivo.